

BLEFAROPLASTYKA (Plastyka powiek górnych)

1. OPIS:

Z wiekiem oraz wtórnie do różnych procesów chorobowych może dochodzić do zwiotczenia skóry powiek. Nadmiar skóry i tłuszczu na powiece powoduje, że powieki stają się wiotkie, co daje niekorzystny efekt wizualny oraz może powodować ograniczenie pola widzenia.

W celu wyeliminowania ww. objawów medycyna oferuje zabieg plastyki powiek górnych, które mają na celu poprawienie wyglądu oka, napięcia skóry oraz polepszenia pola widzenia.

Plastyka powiek górnych – wskazania:

- opadająca powieka górna,
- nadmiar skóry w okolicy oczu,
- skóra powiek zachodząca na rzęsy,
- wiotkość i nadmiar luźnej skóry,
- zmęczone, ciężkie powieki,
- ograniczenie pola widzenia przez opadającą powiekę.

2. OPIS PROPOWANEJ METODY:

Operacja zwiotczenia skóry powiek górnych jest postępowaniem chirurgicznym, które ma na celu usunięcie nadmiaru skóry (niekiedy również tkanki tłuszczowej). Lekarz przed zabiegiem określa ilość skóry i tkanek, którą należy usunąć. Zabieg przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym. Po znieczuleniu wykonywane jest nacięcie wzdłuż uprzednio wyznaczonych przez operatora linii. Po wycięciu nadmiaru skóry brzegi rany zaopatrywane są szwami.

3. ALTERNATYWNE METODY LECZENIA:

W przypadku dużej wiotkości powiek, brak metody alternatywnej dającej dobry efekt.

4. OCZEKIWANE KORZYŚCI LECZENIA:

- zwiększenie pola widzenia,
- przywrócenie prawidłowego stanu anatomicznego stanu powiek i likwidacja następstw okulistycznych,
- poprawa walorów estetycznych.

5. PRZECIWWSKAZANIA:

- ciąża,
- nieuregulowane nadciśnienie tętnicze i cukrzyca,
- zaburzenia krzepliwości krwi,
- choroby serca,
- tendencja do tworzenia bliznowców,
- zespół suchego oka.

6. RYZYKO ZWIĄZANE Z PROPOWANYM LECZENIEM:

Każde leczenie operacyjne niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. W przypadku plastyki powiek do możliwych powikłań należą:

- krwawienie miejsca operowanego – w trakcie lub po operacji,
- infekcja ran pooperacyjnych,
- reakcje alergiczne – na szwy lub preparaty stosowane miejscowo,
- wstrząs – w reakcji na znieczulenie miejscowo,
- niedomykalność powiek,
- rozejście się rany,
- zespół suchego oka.

7. SKUTKI ODLEGŁE PROPONOWANEJ METODY LECZENIA:

- krwiaki lub znacznie przedłużające się zasinienia,
- bliznowacenie rany,
- obrzęki lub niedomykanie powiek,
- rozejście się brzegów rany,
- uczulenia na leki stosowane miejscowo,
- infekcja / zakażenie (niewłaściwa higiena operowanego oka),
- wywinięcie powiek,
- asymetria powiek.

8. ZALECENIA PO ZABIEGU:

Ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich, pozwala zapewnić prawidłowy proces gojenia i minimalizuje ryzyko komplikacji, takich jak rozwój infekcji czy nieprawidłowe bliznowacenie. Lekarz przeprowadzający plastykę powiek zalecają m.in.:

- stosowanie zimnych okładów,
- odpoczynek i ochronę oczu,
- przestrzeganie zaleceń dotyczących higieny,
- unikanie noszenia soczewek kontaktowych,
- unikanie nakładania makijażu.

9. SKUTKI ODMOWY I NIEPODJEĆCIA PROPONOWANEGO LECZENIA:

Odstąpienie od wykonania zabiegu wiąże się z utrzymywaniem następstw okulistycznych nadmiernej wiotkości skóry powiek.

10. BADANIA WYMAGANE PRZED PLASTYKĄ POWIEK GÓRNYCH:

- glukoza
- morfologia
- anty HBS