

## **LABIOPLASTYKA** **(Zmniejszenie warg sromowych)**

### **1. RODZAJ SCHORZENIA I KONIECZNOŚĆ OPERACJI:**

W trakcie postępowania diagnostycznego rozpoznano u Pani przerost warg sromowych mniejszych. Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej istnieją u Pani wskazania do leczenia operacyjnego tego schorzenia. Schorzenie ma charakter wyłącznie estetyczny i brak leczenia operacyjnego nie wpłynie na stan Pani zdrowia. Schorzenie nie zagraża Pani życiu. Zabieg ma za zadanie jedynie poprawę komfortu Pani życia.

### **2. METODY DIAGNOSTYKI ZABIEGOWEJ/LECZENIA OPERACYJNEGO:**

Zostanie wykonana plastyka (zmniejszenie i zmiana kształtu) warg sromowych mniejszych. Zabieg ten przeprowadza się w krótkotrwałym dożylnym znieczuleniu ogólnym. W trakcie operacji może zostać wykonane śródoperacyjne badanie histopatologiczne, którego wynik może wpłynąć na zmianę zakresu operacji.

### **3. WSKAZANIA DO ZABIEGU:**

- dyskomfort i ból podczas codziennego funkcjonowania, uprawiania sportu oraz przy kontaktach seksualnych,
- poprawa samooceny wynikającej z przerostu warg sromowych,
- częste podrażnienia i stany zapalne warg sromowych,

### **4. PRZECIWWSKAZANIA:**

- infekcja pochwy bądź sromu- wykonanie zabiegu możliwe jest dopiero po wyleczeniu choroby,
- uczulenie na leki które stosowane są do znieczulenia pacjentki podczas zabiegu,
- zaburzenia krzepnięcia krwi
- choroba nowotworowa umiejscowiona w obrębie narządów płciowych,
- ciąża i karmienie piersią

### **5. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ:**

Zaden lekarz nie jest w stanie zagwarantować pełnego sukcesu zastosowanego leczenia oraz całkowitego braku ryzyka związanego z zabiegiem operacyjnym. Powikłania związane z tą operacją mogą między innymi polegać na:

- braku satysfakcji estetycznej z przeprowadzonego zabiegu
- pogorszenie jakości życia płciowego
- krwotoku śródoperacyjnym
- wtórnym krwawieniu lub krwiakach *wymagających* przetoczenia krwi i/lub ponownej interwencji operacyjnej
- powikłaniach zakrzepowo-zatorowych (tworzenie się skrzepin i zatykanie naczyń krwionośnych przez skrzepy)
- rozejściu się lub zakażeniu rany pooperacyjnej
- zapaleniu pęcherza moczowego

Ciężkie, zagrażające życiu lub śmiertelne powikłania proponowanego Pani zabiegu operacyjnego zdarzają się rzadko.

### **6. BADANIA WYMAGANE DO LABIOPLASTYKI:**

- cytologia (ważna 1 rok)
- HBS
- HCV
- anty HBC
- VDRL (test w kierunku kiły)
- morfologia
- jonogram
- APTT
- PT
- grupa krwi