

## INFORMACJA DLA PACJENTA WYKONUJĄCEGO BADANIE REKTOSKOPII

### **1. PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:**

- ✓ Należy zakupić w aptece **2 wlewki doodbytnicze** (Enema, Rectanal lub inne dostępne bez recepty).
- ✓ **Na 4 godziny** przed badaniem należy wykonać pierwszą wlewkę a drugą około 2 godziny przed badaniem
- ✓ 6 godzin przed badaniem pozostać na czczo
- ✓ Dla lepszego przygotowania pacjent 24h lub 48h przed badaniem powinien przejść na dietę płynną
- ✓ Jeśli pacjent przyjmuje leki na: nadciśnienie, cukrzyce, choroby serca powinien przyjąć leki popijając je niewielką ilością wody lub powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym

### **2. OPIS BADANIA:**

Rektoskopia jest badaniem endoskopowym, które umożliwia ocenę błony śluzowej jelita grubego, przede wszystkim odbytnicy i esicy. Wykonuje się ją w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Pozwala ono zbadać zmiany o podłożu zapalnym, wrzodowym lub nowotworowym.

Podczas badania pacjent przyjmuje pozycję kolankowo-łokciową. Przed wprowadzeniem endoskopu lekarz wykonuje badanie per rectum - badanie odbytu palcami części zewnętrznej i wewnętrznej. Następnie do odbytu zostaje wprowadzony endoskop (rektoskop).

#### **Wskazania:**

- ✓ zmiana kształtu stolca (stolce ołówkowate, cienkie)
- ✓ problemy z opróżnieniami (nietrzymanie stolca, problemy z oddaniem stolca)
- ✓ zaparcia lub biegunki naprzemiennie z zaparciami
- ✓ przewlekłe biegunki
- ✓ krwawienie z odbytu
- ✓ wydzielina i świąd odbytu
- ✓ endometrioza
- ✓ ból ucisk w okolicy odbytu, bóle podbrzusza
- ✓ podejrzenie polipów, guzów lub owrzodzeń odbytnicy

#### **Wskazania terapeutyczne:**

- ✓ usuwanie polipów
- ✓ hamowanie krwawienia z owrzodzeń i guzów
- ✓ usuwanie ciał obcych

#### **Przeciwwskazania:**

- ✓ choroba Leśniowskiego-Crohna
- ✓ zaburzenia krzepnięcia krwi
- ✓ wrzodziejące zapalenie jelita grubego
- ✓ zaawansowana ciąża

*W naszej placówce mają Państwo możliwość wykonania tego badania w znieczuleniu ogólnym tzw. sedacji lub w znieczuleniu miejscowym . W przypadku wykonania badania w sedacji, która ma na celu uspokojenie pacjenta oraz zwiększenie komfortu podczas zabiegu prosimy o zgłaszanie się na badanie z osobą towarzyszącą.*

**Pacjent po znieczuleniu dożylnym (sedacji):**

- ✓ może nie pamiętać informacji przekazanych przez lekarza
- ✓ nie może prowadzić samochodu oraz maszyn
- ✓ może odczuwać zawroty głowy
- ✓ nie może spożywać alkoholu

**Zaraz po zabiegu:**

- ✓ pacjent może odczuwać dyskomfort w okolicy odbytu
- ✓ może wystąpić lekkie krwawienie z odbytu, szczególnie po usuwaniu polipów

Jeśli pacjent po badaniu skarży się na ból brzucha, oddaje czarne stolce, brzuch jest twardy i spuchnięty powinien zgłosić się do lekarza.

**Wynik z badania pacjent otrzymuje w tym samym dniu.**

Wyjątek stanowi pobranie wycinka histopatologicznego. Na jego wynik pacjent oczekuje od 3-5 tygodni. Pacjent może go odebrać osobiście w rejestracji lub przez osoby trzecie po okazaniu upoważnienia zawierającego imię, nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej.

**Cena 1 wycinka histopatologicznego: 80zł**

**Pacjentów zgłaszających się na badanie prosimy o zabranie ze sobą:**

- ✓ opisu poprzednio wykonanych badań
- ✓ dowodu osobistego (lub innego dokumentu zawierającego nr Pesel)

**W razie rezygnacji z terminu badania prosimy o odwołanie wizyty pod nr tel.:**

**14 627 56 58 kom. 515 058 703 kom. 513 124 140**